

Grader le risque de lésion des
pieds des diabétiques

Corrigé du test de lecture

Module FMC à distance ANCRE

N° 2

Le risque lié à la non perception du monfilament existe s'il n'est pas perçu

- En seul point sur 6, à 2 applications sur 3
- En 2 points sur 6, à 2 applications sur 3
- En 3 points sur 6, à 2 applications sur 3
- En 6 points sur 6, à 2 applications sur 3

Quel grade?

- Quintus varus
- Monofilament non perçu à 1 point sur 6
- Pouls distaux présents
- Pas d'antécédent de lésion

Grade 0	Grade 1	Grade 2	Grade 3
		X	

Quel grade?

- Pas de déformation
- Monofilament non perçu à 6 points sur 6
- Pouls distaux absents aux deux pieds
- Amputation transmétatarsienne pied droit

Grade 0	Grade 1	Grade 2	Grade 3
			X

Quel grade?

- Pas de déformation
- Monofilament non perçu à 3 points sur 6
- Pouls distaux absents aux deux pieds
- Pas d'antécédent de lésion

Grade 0	Grade 1	Grade 2	Grade 3
		X	

Les pieds d'un patient diabétique dont le risque de lésion est supérieur au grade 1 doivent être examinés

- A chaque consultation
- Tous les 3 mois
- Une fois par an
- Lorsque le patient ressent une douleur

A partir du grade 2, la réalisation de soins podologiques est recommandée

- Tous les mois
- Tous les 2 mois
- Tous les 3 mois
- Tous les 6 mois
- Tous les ans

En cas de lésion chez un sujet à haut risque la référence à un centre spécialisé doit être effective dans un délai de

- Deux jours
- Quatre jours
- Une semaine
- Deux semaines
- Un mois